

POSTUPNIK ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE BOLNIČKIH PROSTORA
- JAVNE POVRŠINE (HODNICI, STUBIŠTA, JAVNI WC-I)
NISKI RIZK

| NAZIV DETERGENTA/DEZINFICIJENSA | MJESTO PRIMJENE | NAČIN PRIMJENE |
|------------------------------------|---|--|
| DETERGENT | <p align="center">HODNICI I STUBIŠTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x dnevno mehaničko čišćenje hodnika i stubišta, a u slučaju kontaminacije biološkim materijalom odmah prema posebnom niže navedenom postupku odratiti - 1x mjesečno pranje prozora o čemu se vodi pisana evidencija koja je dostupna na uvid, a u slučaju vidljivog zaprljanja nečistoću otkloniti odmah - 1x mjesečno čišćenje perivih zidova o čemu se vodi pisana evidencija koja je dostupna na uvid, u slučaju vidljivog zaprljanja nečistoću otkloniti odmah | <p>Radnom otopinom detergenta te posebno odvojenim priborom (mopovi/vlasulje za podove, a za pojedine površine: horizonatalne površine i ostali predmeti koristiti krpe u raznim bojama) prebrisati sve površine.</p> <p>Kod hodnika je moguće korištenje mašine za čišćenje</p> |
| DETERGENT | <p align="center">SANITARNI ČVOROVI –JAVNI WC-i (podovi+umivaonici +zahodske školjke)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x dnevno u toku radnog vremena o čemu se vodi pismena evidencija – <u>Nadzorne liste</u>, svaka dva sata spremačica potpisuje iste, u slučaju vidljivog zaprljanja odmah čišćenje i pranje - 1x mjesečno čišćenje perivih zidova o čemu se | <p>Radnom otopinom detergenta te posebno odvojenim priborom (mopovi/vlasulje za podove, a za pojedine površine: horizonatalne površine i ostali predmeti koristiti krpe u raznim bojama) prebrisati sve površine.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | vodi pisana evidencija koja je dostupna na uvid, a u slučaju vidljivog zaprljanja nečistoću otkloniti odmah | Poseban pribor za sanitarne prostore i krpe u boji različite za umivanike i ostale prostore. |
| DETERGENT/DEZINFICIJENS na bazi glutaraldehida (podovi) ili na bazi alkohola sve ostale površine | <u>POVRŠINE U SLUČAJU KONTAMINACIJE BIOLOŠKIM MATERIJALOM:</u> kod prskanja ili prolijevanja krvi ili drugih izlučevina bolesnika: navući mediflex rukavice, pokupiti staničevinom sadržaj (krv ili druge izlučevine), odložiti u crvenu vreću. Nakon toga prekriti kontaminiranu površinu staničevinom koja se prethodno natopi dezinficijensom ostaviti kroz 10 min, nakon čega se staničevina odloži u crvenu vreću te se površina opere/deznificira i posuši na uobičajeni način. | Pripremiti 3 %-tnu radnu otopinu. Kantu napuniti vodom. U kantu odlići potrebnu količinu sredstva odnosno 30ml ml glutaradehida za površine. Krpu za pranje namakati u čistoj a ispirati u nečistoj kanti. Prebrisavanjem vidljivo navlažiti površinu. Površinu ne treba ispirati. Jednom tjedno sve površine oprati neutralnim sredstvom za čišćenje. |
| TEKUĆI SAPUN/TEKUĆI LOSION a 500 ml | MJESTO PORED UMIVAONIKA – dozatori za pranje ruku osoblja. | Sredstvo se nanosi na ruke, potiskom pumpice na dozatoru, ruke se isperu pod tekućom vodom i posuše papirnatim ručnikom |